

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. März 2001 (15.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 01/18545 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: G01N 33/68

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03071

(22) Internationales Anmeldedatum:  
1. September 2000 (01.09.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 43 743.2 3. September 1999 (03.09.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): JERINI BIO TOOLS GMBH [DE/DE]; Rudower  
Chaussee 29, 12489 Berlin (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRAUSE, Eberhard  
[DE/DE]; Kluststrasse 26, 12587 Berlin (DE). BITTORF,  
Thomas [DE/DE]; Birkenallee 5, 18184 Sagerheide (DE).  
SCHNEIDER-MERGENER, Jens [DE/DE]; Hohen-  
zollerndamm 7, 10717 Berlin (DE).

(74) Anwalt: SCHUBERT, Klemens; Joachimstrasse 9, 10119  
Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,  
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,  
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,  
TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-  
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,  
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent  
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu  
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR IDENTIFYING BINDING PARTNERS WITH POSITION-SPECIFIC ARRAYS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON BINDUNGSPARTNERN MIT POSITION-SPEZIFISCHEN  
ARRAYS

(57) Abstract: Disclosed is a method for identifying binding partners with position-specific arrays by means of mass spectrometry. A position-specific ligat array is produced on a carrier material by means of small volumes which are position-specifically mounted and belong to reaction partners. At least two successive reactions are carried out gradually. The position-specific ligat array that is fixed to the carrier material is incubated with a mixture of ligands. Ligands that are not bound to the ligat array are subsequently removed and the ligand/s that is/are bound to the ligat array are further characterised by means of mass spectrometry.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben ist ein Verfahren zur massenspektrometrischen Identifizierung von Bindungspartnern mit positionsspezifischen Arrays, wobei man auf einem Trägermaterial mittels positionsspezifisch aufgetragener kleiner Volumina von Reaktionspartnern ein positionsspezifischer Ligat-Array herstellt, wobei man schrittweise mindestens zwei aufeinander folgende Reaktionen ausführt, das auf dem Trägermaterial fixierte positionsspezifische Ligat-Array mit einem Gemisch von Liganden inkubiert, anschließend nicht an das Ligat-Array gebundene Liganden entfernt und die an das Ligat-Array gebundene/n Ligand/en weiter mittels Massenspektrometrie charakterisiert.

WO 01/18545 A2

**Verfahren zur Identifizierung von Bindungspartnern mit  
positions-spezifischen Arrays**

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur massenspektrometrischen Identifizierung von Bindungspartnern mit positions-spezifischen Arrays.

10 Mit der fortschreitenden Entschlüsselung des menschlichen Genoms wird es mehr und mehr offensichtlich, daß die Funktion von Genen sowie das Verhalten von Genprodukten sehr schwierig oder in den meisten Fällen unmöglich vorherzusagen ist. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, Verfahren zu entwickeln, um die Funktion von Genen zu ermitteln. Die Funktion setzt sich dabei im wesentlichen aus dem dynamischen Auftreten und Verschwinden der Proteine und ihre Interaktion mit Liganden zusammen, die in der Mehrzahl ebenfalls Proteine darstellen. Die Regulation der Funktion von Proteinen ist ein extrem komplizierter Prozeß, der auf verschiedenen Ebenen beeinflußt wird, so z.B. durch posttranslationale Modifikationen, ihre Halbwertszeiten, Kompartimentierung, aber auch dynamischen Veränderungen der Tertiärstruktur. Die Untersuchung der Funktion und der Interaktionen aller Proteine innerhalb einer Zelle wird „Proteomics“ genannt (Dove, 1999; Hochstrasser, 1998), die Gesamtheit aller Proteine einer Zelle wird als „Proteom“ bezeichnet. Dieses Forschungsgebiet wird einen enormen Einfluß auf die Identifizierung von Wirkstoffzielen, Wirkstoffzuschnitt und Wirkstoffentdeckung haben.

35 Die zur Darstellung des Proteoms einer Zelle derzeit fast ausschließlich verwendete Methode ist die zweidimensionale Polyacrylamid-Gelelektrophorese (2D-PAGE). Die Proteine werden in der ersten Dimension durch eine isoelektrische Fokussierung getrennt. Eine dazu orthogonal ausge-

fürte SDS-Elektrophorese bildet die zweite Dimension. Diese Methode ermöglicht heute die Analyse tausender Proteine aus einem zweidimensionalen Gel innerhalb einiger Tage. Inzwischen ist man sich jedoch der Tatsache bewußt, daß es schwierig ist, mehr als 50 bis 60 Prozent eines Proteoms auf einem einzelnen 2D-Gel aufzutrennen, was an den sehr unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften der zellulären Proteine liegt. Des weiteren kommen die meisten zellulären Proteine in sehr geringen Mengen in der Zelle vor.

Zu einer weiteren Analyse wird das im 2D-Gel aufgetrennte und als Bande oder Spot isolierte Protein vor seiner Elution aus der Matrix meist proteolytisch verdaut. Dazu muß die Matrix des Gels geschrumpft werden und die Bedingungen im Gel für den Verdau geeignet sein. Der Verdau dauert zudem mehrere Stunden.

Blüggel und Immler (Biospektrum 5/98, S. 39-44) beschreiben im Anschluß an die oben genannten Verfahrensschritte eine weitere Charakterisierung von Peptid Fragmentspektren mittels Massenspektrometrie. Diese nur für die Analyse eines einzelnen Proteinspots geeignete Methode ist jedoch sehr umständlich und immer noch weit von den für die effektive Analyse geforderten Automatisierungsgraden entfernt.

Ein Schlüsselaspekt bei Proteomics und Wirkstofffindung ist die Identifizierung von Signalkaskaden (pathways) in Zusammenhang mit Rezeptor-Ligand-Interaktion-vermittelter Stimulierung von Zellen. Diese Signalkaskaden beinhalten Kaskaden von Protein-Protein-Interaktionen, die lediglich nichtkovalente physikalische Interaktionen von Netzwerkproteinen, aber auch Kontakte enzymatischen Typs, wie Phosphorylierung, Dephosphorylierung oder proteolytische Interaktionen sein können.

Die im Augenblick vorhandene Methode der Wahl zur Identifizierung von zellulären interagierenden Partnern ist das „two-hybrid“ Screeningsystem in Hefe (z.B. Colas und Brent, TIBTECH 1998, 16 S. 355-363). Dieser in vitro Ansatz führt jedoch oftmals zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen.

Die US 5,821,047 beschreibt einen weiteren aktuellen Ansatz zur Identifizierung von zellulären interagierenden Partnern, das sogenannte „phage display“. Das Verfahren umfaßt die Fusion eines zu untersuchenden Proteins an die carboxyterminale Domäne des Gen III coat Proteins des filamentösen Phagen M13. Mit diesem auf der Oberfläche des Phagen M13 präsentierten Fusionsprotein wird dann nach neuen Liganden des zu untersuchenden Proteins gescreent.

Eine weitere interessante und sich verbreitende Technik ist die Oberflächen-Plasmon-Resonanz-Biomolekular-Interaktionsanalyse Massenspektrometrie (BIA/MS) (Nelson und Krone, 1999). Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Ansatz im Hinblick auf Signifikanz der Daten als auch auf nötige Automatisierung als praktikabel erweisen wird.

Dazu werden auf Cellulosemembranen mit der sogenannten „Spot-Synthesetechnik“ synthetisierte Peptide verwendet, um molekulare Erkennungsereignisse zu untersuchen.

Alle oben beschriebenen Verfahren zur Analyse des Proteoms und der Untersuchung im Bereich der Proteomics weisen erhebliche Nachteile auf. Sie sind experimentell aufwendig und zeitintensiv und erfassen bei der Analyse nicht alle Proteine einer Zelle auf einmal. Die 2D-PAGE ist zudem für viele Proteine nicht sensitiv genug und für die Proteomics-Analyse ungeeignet, da sie keine Interaktionen von Proteinen einer Zelle erfassen kann.

Alle vorgenannten Verfahren und Methoden sind zudem für eine in der Wirkstoff-Entwicklung mehr und mehr gefragte Automatisierung ungeeignet.

5

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Identifizierung von zellulären interagierenden Partnern für die Proteom-Analyse zur Verfügung zu stellen, das eine schnelle, preiswerte und zuverlässige Analysemethode zur Identifizierung von zellulären interagierenden Partnern darstellt und sich ohne große Probleme automatisieren läßt.

10

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

15

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur massenspektrometrischen Identifizierung von Bindungspartnern mit positionsspezifischen Arrays, wird auf ein Trägermaterial mittels positionsspezifisch aufgebracht kleiner Volumina von Reaktionspartnern ein positionsspezifischer Ligat-Array hergestellt, wobei man schrittweise mindestens zwei aufeinander folgende Reaktionen ausführt. Das auf dem Trägermaterial fixierte positions-spezifische Ligat-Array mit einem Gemisch von Liganden inkubiert, anschließend nicht an das Ligat-Array gebundene Liganden entfernt und der/die an das Ligat-Array gebundene/n Ligand/en weiter mittels Massenspektrometrie charakterisiert.

20

25

Überraschenderweise konnte gefunden werden, daß die Kombination von Inkubation eines Liganden-Gemisches mit einem auf einem Träger gebundenen positions-spezifischen Array und anschließender Analyse der gebundenen Proteine mittels Massenspektrometrie die oben genannten Probleme des Standes der Technik vermeidet und eine preiswerte, schnelle, robuste und zuverlässige Methode zur Proteom-

30

35

Analyse darstellt. Weiterhin kann dieses Verfahren ohne große Probleme vollständig automatisiert werden, so daß eine hoher Probendurchsatz bei geringen Kosten gewährleistet ist.

5

Beim erfindungsgemäßen Verfahren ist es bevorzugt, daß das Ligat-Array ein Peptidarray, Array aus Nucleinsäuren oder anderen organochemischen Verbindungen oder über Fragmentkondensation von Peptiden erhaltenes Proteinarray ist. Es ist insbesondere bevorzugt, daß das Gemisch von Liganden ein Zelllysate, Gemisch von Nucleinsäuren oder Gemisch von anderen organochemischen Verbindungen ist.

10

Es werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zunächst aufwendige Aufbereitungsschritte der aufgeschlossenen Zellen vermieden, da in einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens alle Proteine einer Zelle ohne Reinigung auf einmal analysiert werden können. Die Verwendung von positions-spezifischen Arrays erlaubt zudem eine Standardisierung des Verfahrens. Das für das Verfahren verwendete Trägermaterial für das Peptidarray kann fest oder flexibel sein und besteht bevorzugterweise aus Harzbeads, Polymerpins oder Chipmaterial. Besonders bevorzugt ist es, wenn das verwendete Trägermaterial aus einer Polymermembran besteht, wie zum Beispiel einer Nylon-, Cellulose- oder modifizierten Cellulose oder modifizierten Polypropylenmembran.

15

20

25

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird als Zelllysate normalerweise ein Vollzelllysate verwendet, es kann jedoch auch ein durch Zentrifugation, Filtration oder andere geeignete Verfahren vorfraktioniertes Vollzelllysate verwendet werden. Das Zelllysate kann ein Lysate aus prokaryontischen oder eukaryontischen Zellen sein, es können auch transformierte oder transgene Zellen verwendet werden.

30

35

Besonders bevorzugt ist es, wenn als Zelllysats ein  $^{35}\text{S}$ -Methionin-markiertes oder  $^{35}\text{S}$ -Cystein-markiertes Lysat verwendet wird.

5

Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß das Zelllysats zusammen mit mindestens einem definierten Cofaktor verwendet wird. Als Cofaktoren können zum Beispiel Proteine oder Metallionen verwendet werden.

10

Ein bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, daß die für das Peptidarray verwendeten Peptide zwischen 3 und 30 Aminosäuren lang sind. Bevorzugt sind Peptide zwischen 6 und 15 Aminosäuren Länge, besonders bevorzugt sind Peptide von 13 Aminosäuren Länge. Besonders bevorzugt ist eine erfindungsgemäße Ausführungsform, bei der die für das Peptidarray verwendeten Peptide über einen Linker an das Trägermaterial fixiert sind. Dieser Linker kann Protease-sensitiv oder chemisch spaltbar sein.

15

20

Ein weiteres bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Peptidarray ein SPOT-Peptidarray ist.

25

Nicht an das Peptidarray gebundenes Protein kann erfindungsgemäß mittels Waschen mit einem Puffer oder durch Fällung entfernt werden.

30

Eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß das/die an das Peptidarray gebundene/n Protein/e vor der Proteasebehandlung vom Trägermaterial gelöst und anschließend einer Gelelektrophorese unterzogen wird/werden.

35



Die Charakterisierung der Protease-behandelten Proteine oder der Liganden oder abgespaltenen Liganden erfolgt erfindungsgemäß mittels Massenspektrometrie, bevorzugt mittels MALDI oder ESI Massenspektrometrie, ganz besonders  
5 bevorzugt mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie.

Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die Tatsache, daß sich alle Schritte der Proteomics-Analyse vollständig automatisieren lassen. Ein weiterer  
10 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Roboter zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Die SPOT-Synthese (R. Frank, Tetrahedron 1992, 48, 9217-9232, DE-OS 4027675) ist eine etablierte Methode zur  
15 ortsadressierten Synthese von Peptiden und deren Screening auf Bindung zu Proteinen (A. Kramer, J. Schneider-Mergener, Meth. Mol. Biol. 1998, 87, 25-39, A. Kramer, A. Schuster, U. Reineke, J. Schneider-Mergener, METHODS (Comp. Meth. Enzymol.) 1994, 6, 388-395.). Neben Peptiden  
20 sind auf diese Weise auch andere Verbindungsklassen wie z.B. Peptoide (T. Ast, N. Heine, L. Germeroth, J. Schneider-Mergener, H. Wenschuh, Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4317-4318) zugänglich.

25 Das erfindungsgemäße Verfahren ist mit den unterschiedlichsten Ligaten anwendbar. Geeignete Ligate, welche sich zu den erfindungsgemäßen positionsspezifischen Ligat-Arrays aufbauen lassen, sind beispielsweise, ohne auf diese beschränkt zu sein, Peptide,  $\beta$ - und  $\gamma$ -Peptide, Pep-  
30 toide, (Oligo-)Harnstoffe, (Oligo-)Thioharnstoffe, (Oligo-)Carbamate, (Oligo-)Carbonate, Triazine, (Oligo-)Sulfonamide, Azatide sowie Glyco-Konjugate der vorgenannten Verbindungen, (Oligo-)Saccharide, PNA (Peptide-Nulceic-Acid), Hydantoine, 2-Piperazone,  
35 Isochinoline, Benzodiazepine, pharmakologisch aktive Verbindungen und Wirkstoffe (beispielsweise Antidepressiva,

- $\beta$ -Blocker, cardiovascular aktive Verbindungen, Antarrhythmika, Antihistaminika, Tranquillantien, H<sub>2</sub>-Blocker, Acidose-Therapeutika, Aminoglycosid-Antibiotika, Amoebicide, Anästhetika, Analgetica, Androgene, Antacida, Anthelmintica, Antiallergika, Antiandrogene, Antibiotika, Anticholinergika, Anticoagulantien, Anticonvulsiva, Antidote, Antiemetica, Antifibrinolytika, Antihypertensiva, Antihypertonica, Antihypotonica, Antimalariamittel, Antimycotica, Antiparkinson-Mittel, Antiphlogistika, Antipsoriatica, Antipyretica, Antirhematica, Antiscabiase, Antiseborrhoica, Antiseptica, Antitumormittel, Antitussiva, Atemanaleptika, Bronchiolytika, Calciumantagonisten, Cardiotonica, Cerebrotonica, Chemotherapeutica, Cholesterinsenker, Cytostatika, Dehydropeptidase-Inhibitoren, Desinfizientia, Diagnostika, Diuretica, Expektorantien, Fibrinolytika, Fungicide, Gestagene, Glucocorticoide, Gonadorelin (LH-RH)-Agonisten, Hypnotica, Immunstimulantien, Immunsuppressiva, Keratolytika,  $\beta$ -Lactamase-Inhibitoren, Laxativa, Lebertherapeutika, Lichtschutzmittel, Lipidsenker, Lipolyse-Inhibitoren, Lipotropica, Lokalanästhetika, Malariamittel, Miotica, Muskelrelaxantien, Mydriatica, Neuroleptika, Neurotropica, Ophthalmologica, Parasympathicomimetika, Prostatatherapeutika, Protelytika, Psychotropica, Rhinologica, Röntgenkontrastmittel, Sedativa, Spasmolytika, Spermatozide, Sympathicomimetika, Thrombocyten-Aggregationshemmer, Trypsin-Inhibitoren, Tuberkulostatika, Ulcustherapeutika, Vasoconstrictoren, Vasodilatoren, Venenmittel, Virustatica, Vitamine) oder Naturstoffe (beispielsweise Steroide, Terpene, Alkaloide, Flavonoide, Fettsäuren, Lipide, Pheromone, Riechstoffe, Antikörper, Hormone, Gifte, Abwehr-, Signal- und Wachstumsstoffe, Enzyme) und andere als die oben genannten organochemischen Verbindungen.
- Die Erfindung soll anhand der folgenden Beispiele näher beschrieben werden.

Dabei zeigt Figur 1, daß  $^{35}\text{S}$ -markierte Proteine an immobilisierte Peptide binden, welche die intrazelluläre EPOR-Domäne repräsentieren. Cellulose-gebundene überlap-  
pende Peptide (13mere, 10 Aminosäuren Überlappung), die  
5 die gesamte intrazelluläre Domäne des EPOR abdecken  
(Peptid Nummer 1 repräsentiert Aminosäuren 248-260, Nummer 2 Aminosäuren 251-263 usw; für Sequenzinformation siehe Figur 3), wurden mit Lysaten von EPO-stimulierten  
10 (A) oder unbehandelten (B) J2E erythroleukämischen Zellen nach Markierung mit  $^{35}\text{S}$ -Methionin/Cystein inkubiert. Gebundene Proteine wurden durch Autoradiographie detektiert.

Figur 2 zeigt eine in vitro Translation von cDNA's, die für verschiedene Signalmoleküle kodieren. Die cDNA's wurden subkloniert und einer in vitro Translation unter der Verwendung von T7 und T3 Polymerase wie beschrieben unterzogen (eine von beiden Reaktionen diente als interne  
20 Kontrolle). Ein Aliquot des Reaktionsgemisches wurde mittels PAGE getrennt. Radioaktive Proteine wurden durch Autoradiographie nach fluorographischer Verstärkung detektiert. Das Molekulargewicht ist auf der rechten Seite angegeben (in kDa).

25 Figur 3 zeigt ein Bindungsmuster von JAK2, SHP1 und PLC $\gamma$  an immobilisierte Peptide der EPOR-Sequenz. (A) Sequenzen von Cellulose-gebundenen überlappenden Peptiden. (B) Radioaktiv markierte Proteine wurden mit den immobilisierten Peptiden wie beschrieben inkubiert und durch Autoradiographie sichtbar gemacht. (C) Die Sequenz der gesamten intrazellulären Domäne ist gezeigt und Regionen mit den stärksten radioaktiven Signalen sind für die entsprechenden angegebenen Proteine mit Kästen markiert.

35

Figur 4 zeigt ein MALDI Mass Fingerprint des Spots E2 (Thyrosin-Protein-Kinase JAK3).

Figur 5 zeigt die MS-Fit-Rechnung des Spots E2 aus Figur 4 dar

Figur 6 zeigt die  $^{35}\text{S}$ -Aktivität nach Inkubation einer Bibliothek aus 1600 Dipeptoiden mit  $^{35}\text{S}$ -Methionin markiertem Zell-Lysat.

Identifizierung von Bindungspartnern des Erythropoetin-Rezeptors mit positions-spezifischen Peptidarrays und Massenspektrometrie

Um potentielle intrazellulär interagierende Partner des Erythropoetin Rezeptors (EPOR) zu identifizieren, wurden Zelllysate von Erythropoetin (EPO) stimulierten und nicht-stimulierten Zellen mit Cellulosemembran-gebundenen EPOR-spezifischen Peptidscans inkubiert, der Proteingehalt verschiedener ausgewählter Spots einer Gelelektrophorese unterzogen und distinkte Banden mittels Massenspektrometrie analysiert.

In früheren Experimenten konnte gezeigt werden, daß Inkubation eines Sets von an eine Cellulosemembran gebundenen überlappenden Peptiden, die vom cytoplasmatischen Teil des 55 kDa Tumor-Nekrosisfaktor Rezeptor (TNF-R55) stammen, mit einem  $^{35}\text{S}$ -Methionin markierten Jurkat Zelllysate zu einer Bindung von zellulären Proteinen an distinkte Spots des TNF-R Scans führte. Die durch diesen Ansatz hervorgehobenen TNF-R Regionen entsprachen exakt den vorher als für die verschiedenen biologischen Funktionen dieses Rezeptors verantwortlich beschriebenen intrazellulären TNF-R Regionen. Weiterhin konnte gezeigt werden, daß ein durch das Hefe „two-hybrid“ System neu entdecktes Protein FAN spezifisch mit distinkten Spots des TNF-R Scans interagiert, der einer Region entsprach, die für

die Aktivierung der neutralen Sphingomyelinase bekannt ist. Die Verwendung der zwei Techniken führte deshalb zu einer relativ schnellen Identifizierung eines neuen an der TNF Signalkaskade beteiligten Proteins. Dennoch war dieser Prozeß relativ arbeitsaufwendig, da eine große Zahl von durch das „two-hybrid“ System erhaltenen cDNA Klonen (>50) auf eine Bindung an eine bestimmte Region des Rezeptors hin zu charakterisieren waren.

Um einen direkteren Weg zur Identifizierung von interagierenden Partnern in der zellulären Signalkaskade unter Umgehung des Hefe „two-hybrid“ Systems zu untersuchen, wurde versucht, Proteine direkt von den Spots zu erhalten und diese sie durch tryptischen Verdau, Massenspektrometrie und Datenbankanalyse zu analysieren. Um diesen neuen experimentellen Ansatz zu testen, wurde in diesem Fall ein Cellulosemembran-gebundener von EPO-R stammender Peptidscan synthetisiert, der dann mit EPO-ansprechenden J2E Erythroleukämischen Zelllysaten inkubiert wurde, die mit <sup>35</sup>S-Methionin/Cystein markiert waren (siehe Figur 1). Es konnte eine Bindung an distinkte Rezeptor-spezifische Spots beobachtet werden. Überraschenderweise gab es einen klaren Unterschied in der Bindung bei der Verwendung eines Lysats einer mit EPO stimulierten J2E Zelle.

Die intrazellulären Domänen der Cytokinrezeptoren sind bekannterweise aus strukturellen Modulen für die Bindung von spezifischen zellulären Signalproteinen zusammengesetzt. Es wird vermutet, daß die Fähigkeit, mit bestimmten Targets zu interagieren, Kompetenz und Spezifität bei der Regulation der Genexpression bewirkt. Um eine neue Strategie zur Analyse der Interaktionen zwischen zellulären Proteinen und Peptiden, welche die intrazelluläre Domäne des EPO Rezeptors repräsentieren, zu untersuchen, wurden durch die Spot-Synthese hergestellte Cellulose-gebundene Peptide angewendet. Zelluläre Proteine der

Erythroleukämischen EPO-ansprechenden Zelllinie J2E wurden in vivo durch die Inkorporation von  $^{35}\text{S}$ -Aminosäuren markiert und wie beschrieben mit den immobilisierten Peptiden inkubiert. Figur 1 zeigt die Bindungsmuster von Zell-

5 lysaten aus mit EPO stimulierten oder unbehandelten Zellen. Es konnten starke Protein/Peptid Interaktionen hauptsächlich mit Peptiden beobachtet werden, die der proximalen Membranregion des EPOR entsprachen. Die Stimulierung mit EPO erhöht offensichtlich die Affinität einiger

10 Proteine zu bestimmten Peptiden, hingegen bleibt die Mehrheit der Interaktionen unverändert.

Um die Bindungseigenschaften einzelner Proteine zu untersuchen, für die bekannt war, daß sie mit dem EPOR interagieren, wurde eine Auswahl von in vitro translatierten

15 Proteinen in demselben System verwendet. Das Vorhandensein und Reinheit von einzelnen radioaktiven Proteinen der erwarteten Größe wurde durch PAGE überprüft (Figur 2). Nachfolgende Versuche wurden unter der Verwendung von

20 Präparationen durchgeführt, die eine radioaktiv markierte Proteinspezies enthalten um sicherzustellen, daß alle gefundenen Interaktionen spezifisch sind.

Das Bindungsmuster von drei Signalmolekülen, die bekanntermaßen am EPOR-Komplex beteiligt sind, ist in Figur 3

25 dargestellt. Die markierten Proteine interagieren spezifisch mit den von EPOR stammenden Peptiden. JAK2 wird als die entscheidende Kinase betrachtet, die EPOR-induzierte Signalaktivitäten vermittelt und für das Fehlen jeglicher

30 intrinsischer Enzymaktivitäten in der intrazellulären Domäne substituiert. JAK2 bindet vornehmlich an die sehr Membran-proximalen Aminosäuren und zusätzlich an Peptide, die einer distalen Region des Rezeptors entsprechen.

35 Die Membran-proximale Bindung stimmt mit den Daten über EPOR-Mutanten überein, die wiederholt gezeigt haben, daß

JAK2 mit stark carboxyterminal trunkierten Rezeptorformen Immunopräzipitiert. Zusätzlich beseitigen Mutationen in der Region nahe der Membran die JAK2-Bindung und -Funktion gleichermaßen. Eine zweite Interaktionsstelle wurde in einem mehr distalen Teil des Rezeptors identifiziert. Interessanterweise bindet SHP1, eine Tyrosinphosphatase, die bekannterweise funktionell an der EPO-induzierten Signalkaskade beteiligt ist, mit hoher Affinität an dieselben Peptide, die Aminosäuren 386-398 und ebenso an die proximale Membran-Aminosäuresequenz wie für JAK2. Es wurde früher gezeigt, daß die Phosphatase, welche die SH2-Domäne enthält, an das Phosphotyrosin 429 im carboxyterminalen Teil des aktivierten Rezeptors bindet. Die hier vorgelegten Ergebnisse wurden mit unphosphorylierten Peptiden erhalten, obwohl eine Phosphorylierung durch eine Kinase, die in dem für die in vitro Translation verwendeten Reticulocytenlysat vorliegen könnte nicht vollständig auszuschließen ist. Das Bindungsmuster zeigt, daß vielleicht zusätzliche Interaktionen unabhängig von einer Phosphorylierung existieren. JAK2 und SHP1 wurden als funktional zusammenhängend beschrieben und interagieren ebenso in in-vitro Experimenten. Wie oben genannt, enthält das für die in vitro Translation verwendete Lysat zusätzliche nichtradioaktive Proteine, die in der Bindungsreaktion stören können. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, daß JAK2 an die bevorzugte SHP1 Stelle bindet und umgekehrt. Wenn Bindung von „kaltem“ JAK2 und SHP1 an die Peptide annehmen, kann radioaktives Jak2 und SHP1 wechselwirken und dadurch indirekt an die Peptide gebunden werden. Die genaue Stelle der Interaktion für PLC $\gamma$  und den EPOR ist bisher noch nicht beschrieben. Ob PLC $\gamma$ -Bindung eine Bindung an spezifische Tyrosine innerhalb des EPOR benötigt, bleibt festzustellen. Unsere Daten deuten auf eine Bindungsdomäne in der Nähe des C-Terminus hin, die möglicherweise zu der vorgeschlagenen SH2-Phosphotyrosin Interaktion führt.

Um den oben beschriebenen Ansatz weiter zu vertiefen, wurde untersucht, ob es möglich ist, Proteine zu identifizieren, die an Peptide gebunden sind, welche von der Rezeptorsequenz stammen. Dazu wurden Peptide verwendet, die eine starke Interaktion mit zellulären Proteinen zeigten, mit Zelllysaten inkubiert und die Proteine nach ausgiebigem Waschen wie beschrieben eluiert. Nach Trennung auf Acrylamid wurden diese Proteine gefärbt, in-Gel enzymatisch verdaut, die Fragmente isoliert und einer Massenspektrometrie unterzogen. Die Reinheit und Menge der in den Gelbanden vorhandenen Proteine war für absolut ausreichend, um die aus den Peptidspots erhaltene Proteinspezies über Peptid Mass Fingerprints zu identifizieren. Einige dieser Proteine sind für Funktionen in Zusammenhang mit EPOR nicht beschrieben. Zum Beispiel wurde die Janus Kinase JAK3, von der bekannt ist, daß sie an IL-2,4,7,9,15 Signalkaskaden beteiligt ist, als ein Bindepartner von Peptiden aus der EPOR-Sequenz identifiziert (Figur 4 und Figur 5). Weitere Untersuchungen über die funktionelle Relevanz der identifizierten Proteine folgen.

#### In-Gel-Verdau

Ein von Shevchenko et al. (1) verwendetes und leicht modifiziertes In-Gel-Verdau Verfahren wurde angewendet. Die Proteinspots wurden ausgeschnitten, mit 50% Acetonitril in 25 mM Ammoniumbicarbonat, durch Dehydrierung in Acetonitril geschrumpft und in einer Vakuumzentrifuge getrocknet.

Die Gelstücke wurden 10 µl 5 mM Ammoniumbicarbonat mit 300 ng Trypsin aufgequollen. Nach 60 min, wurde 5 µl 5 mM Ammoniumbicarbonat hinzugefügt, um die Gelstücke während des tryptischen Verdaus feucht zu halten (37°C, über Nacht). Um die Peptide zu extrahieren, wurden 15 µl 0,5%



Trifluoressigsäure (TFA) in Acetonitril hinzugefügt und die Proben für 5 min beschallt. Die Peptide wurden direkt aus der abgetrennten Flüssigkeit mittels MALDI Massenspektrometrie analysiert.

5

#### MALDI Massenspektrometrie und Datenbanksuche


Die massenspektrometrischen Messungen wurden auf einer Voyager-DE STR BioSpectrometrie Workstation MALDI-TOF Massenspektrometer (Perseptive Biosystems, Inc.) durchgeführt. 2 µl der Analyselösung wurde mit 2 µl alpha-Cyano-4-hydroxymethylsäure (4-HCCA) Matrixlösung, bestehend aus 10 mg Matrix in 1 ml 0,3% TFA in Acetonitril-Wasser (1:1, v/v) gelöst, gemischt. Von der erhaltenen Mischung wurde 1 µl auf die Probenplatte aufgebracht. Die Proben wurden bei Raumtemperatur (24°C) luftgetrocknet. Alle Messungen wurden im Reflektionsmodus bei einer Beschleunigungsspannung von 20 kV, 70% Gitterspannung und einer Verzögerung von 200 ns durchgeführt. Jedes erhaltene Spektrum war das Mittel aus 256 Laserbeschüssen. Die Massenspektren wurden unter der Verwendung bekannter Trypsinfragmente als interne Standards kalibriert. Die bestimmten Peptidmassen wurden mit theoretischen Massen von Proteinen aus der NCBI Inr.11.09.98 Datenbank unter der Verwendung des Suchprogramms MS-FIT verglichen

(<http://falcon.ludwig.ucl.ac.uk/msfit.htm>).

#### Bestimmung von Bindungspartnern einer Peptoid-Bibliothek

Eine Bibliothek aus 1600 Dipeptoiden (Membrangröße: 9 cm x 9 cm) der allgemeinen Formel I


30




worin R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> für beliebige Reste stehen,

wurde mit einem  $^{35}\text{S}$ -Methionin markiertem Zell-Lysat inkubiert. Die Positionen A, B und C, stellen dabei die folgenden Verbindungen dar:


Dipeptoid A



Dipeptoid B



Dipeptoid C





## Patentansprüche

1. Verfahren zur massenspektrometrischen Identifizierung  
5 von Bindungspartnern mit positionsspezifischen Arrays, wobei man  
auf ein Trägermaterial mittels positionsspezifisch  
aufgebrachter kleiner Volumina von Reaktionspartnern  
ein positionsspezifischer Ligat-Array herstellt, wobei  
10 man schrittweise mindestens zwei aufeinander folgende  
Reaktionen ausführt,  
das auf dem Trägermaterial fixierte positions-  
spezifische Ligat-Array mit einem Gemisch von Ligan-  
den inkubiert,  
15 anschließend nicht an das Ligat-Array gebundene Li-  
ganden entfernt und  
der/die an das Ligat-Array gebundene/n Ligand/en wei-  
ter mittels Massenspektrometrie charakterisiert.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
daß das Ligat-Array ein Peptidarray, Array aus  
Nucleinsäuren oder anderen organochemischen Verbind-  
ungen oder über Fragmentkondensation von Peptiden  
erhaltenes Proteinarray ist.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
daß das Gemisch von Liganden ein Zelllysate, Gemisch  
von Nucleinsäuren oder Gemisch von anderen organoche-  
mischen Verbindungen ist.
- 30 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  
man auf einem Trägermaterial mittels positionsspezi-  
fisch aufgebrachter kleiner Volumina von Reaktions-  
partnern ein positionsspezifischer Peptidarray her-  
stellt,  
35 das auf das Trägermaterial fixierte positions-

- spezifische Peptidarray mit einem Zelllysate inkubiert,  
anschließend nicht an das Peptidarray gebundenes Protein entfernt und
- 5 das/die an das Peptidarray gebundene/n Protein/e nach Proteasebehandlung mittels Massenspektrometrie charakterisiert.
- 10 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Trägermaterial fest oder flexibel ist.
- 15 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Trägermaterial aus Harzbeads, Polymerpins oder Chipmaterial besteht.
- 20 7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Trägermaterial aus einer Polymermembran besteht.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Trägermaterial aus einer Nylon-, Cellulose-, modifizierten Cellulose- oder modifizierten Polypropylenmembran besteht.
- 30 9. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man als Zelllysate ein Vollzelllysate verwendet.
- 35 10. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man als Zelllysate ein durch Zentrifugation, Filtration oder andere geeignete Verfahren vorfraktioniertes Vollzelllysate verwendet.
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß man als Zelllysate ein Lysate aus prokaryontischen oder eukaryontischen Zellen verwendet.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man als Zelllysate ein Lysat aus transformierten Zellen verwendet.
- 5
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß man als Zelllysate ein <sup>35</sup>S-Methionin- oder <sup>35</sup>S-Cystein-markiertes Lysat verwendet.
- 10
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß man das Zelllysate zusammen mit mindestens einem definierten Cofaktor verwendet.
- 15
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß man Cofaktoren Proteine oder Metallionen verwendet.
- 20
16. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die für das Peptidarray verwendeten Peptide zwischen 3 und 30 Aminosäuren lang sind.
- 25
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die für das Peptidarray verwendeten Peptide zwischen 6 und 15 Aminosäuren lang sind.
- 30
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die für das Peptidarray verwendeten Peptide 13 Aminosäuren lang sind.
19. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die für das Ligat-Array verwendeten Ligate über einen Linker an das Trägermaterial fixiert sind.
- 35
20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Linker Protease-sensitiv ist.

21. Verfahren nach Anspruch 19 dadurch gekennzeichnet,  
daß der Linker chemisch spaltbar ist.
- 5 22. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,  
daß der verwendete Peptidarray ein SPOT-Peptidarray  
ist.
- 10 23. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
daß die weitere Charakterisierung der Liganden mit-  
tels MALDI oder ESI Massenspektrometrie erfolgt.
- 15 24. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,  
daß man das nicht an das Peptidarray gebundene Prote-  
in mittels Waschen mit einem Puffer entfernt.
- 20 25. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,  
daß man das nicht an das Peptidarray gebundene Prote-  
in durch Fällung entfernt.
26. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,  
daß man das/die an das Peptidarray gebundene/n Prote-  
in/e vor der Proteasebehandlung vom Trägermaterial  
25 löst und anschließend einer Gelelektrophorese unter-  
zieht.
- 30 27. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,  
daß die Charakterisierung der Protease-behandelten  
Proteine mittels MALDI oder ESI Massenspektrometrie  
erfolgt.
28. Roboter zur Durchführung des Verfahrens nach einem  
der vorgenannten Ansprüche.


**Fig. 1****Fig. 2**

2/4

Fig. 3

## Sequences of EPOR-derived peptides

1	SHRRTLQKWPQ	2	RTLOQKWPQPS	3	GQKWPQPSPE
4	WPQPSPESEFE	5	GPSPSEFGLF	6	SPSEFGLFTTH
7	SEFGLFTTHKGN	8	EGLFTTHKGNFQL	9	FTTHKGNFQLWLL
10	HKGNFQLWLLQRD	11	NFQLWLLQRDGCL	12	LWLLQRDGCLWWS
13	LQRDGCLWWSPGS	14	DGCLWWSPGSFP	15	LWWSPGSFPEDP
16	SPGSFPEDPPAH	17	SFPEDPPAHLEV	18	PPEDPPAHLEVLSE
19	PPAHLEVLSEPRW	20	HLEVLSEPRWAVT	21	VLSEPRWAVTQAG
22	EPRWAVTQAGDPG	23	WAVTQAGDPGADD	24	TQAGDPGADDEGP
25	GDPGADDEGPLE	26	QADDEGPLLEPG	27	DEGPLLEPGSEH
28	PLLEPGSEHAQD	29	EPVGSEHAQDTYL	30	GSEHAQDTYLVLD
31	HAQDTYLVLDKWL	32	DTYLVLDKWLPR	33	LVLKWLPRTPCS
34	DKWLPRTPCSEN	35	LLPRTPCSENLG	36	RTPCSENLGPGG
37	CSENLGPGGSDV	38	NLSPGGSDVPVT	39	PGGSDVPVTMDE
40	GSDVPVTMDEASE	41	DPVTMDEASETSS	42	TMDEASETSSCP
43	EASETSSCPDLA	44	ETSSCPDLASKP	45	SCPSDLASKPRPE
46	DLASKPRPEGTS	47	ASKPRPEGTSPS	48	PRPEGTSPSFEY
49	EGTSPSFEYTL	50	SPSFEYTLDP	51	SFEYTLDPASQL
52	YTLDPSSLCLP	53	LDPSQLCLPRAL	54	SSLCLPRALPPE
55	LLCPRALPPELP	56	PRALPPELPPTP	57	LPPELPPTPPLK
58	ELPPTPPLKLYL	59	PTPPLKLYLVV	60	PLKLYLVVSDS
61	KLYLVVSDSGIS	62	YLVVSDSGISDV	63	VSDSGISDVSSG
64	SGISDVSSGGSG	65	STDYSSGGSGGVH	66	YSSGGSGGVHSDS
67	GGSGGVHSDSDG	68	QGVHSDSDGPGYS	69	HGSDSDGPGYSHY
70	SGDGYSHPYENS	71	GPYSHPYENSLV	72	SHPYENSLVDSSE
73	YENSLVDSSEPLH	74	SLVDSSEPLHFGY	75	PDSEPLHFGYVAC
76	DSEPLHFGYVACS				








**Fig. 6**

1



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. März 2001 (15.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 01/18545 A3

(51) Internationale Patentklassifikation: G01N 33/68,  
C12Q 1/68, G01N 33/543, H01J 49/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03071

(22) Internationales Anmeldedatum:  
1. September 2000 (01.09.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 43 743.2 3. September 1999 (03.09.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): JERINI BIO TOOLS GMBH [DE/DE]; Rudower  
Chaussee 29, 12489 Berlin (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRAUSE, Eberhard  
[DE/DE]; Kluistrasse 26, 12587 Berlin (DE). BITTORF,  
Thomas [DE/DE]; Birkenallee 5, 18184 Sagerheide (DE).  
SCHNEIDER-MERGNER, Jens [DE/DE]; Hohen-  
zollerndamm 7, 10717 Berlin (DE).

(74) Anwalt: SCHUBERT, Klemens; Joachimstrasse 9, 10119  
Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,  
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,  
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,  
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-  
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,  
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent  
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen  
Recherchenberichts: 13. September 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR IDENTIFYING BINDING PARTNERS WITH POSITION-SPECIFIC ARRAYS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON BINDUNGSPARTNERN MIT POSITIONS-SPEZIFISCHEN  
ARRAYS

(57) Abstract: Disclosed is a method for identifying binding partners with position-specific arrays by means of mass spectrometry. A position-specific ligat array is produced on a carrier material by means of small volumes which are position-specifically mounted and belong to reaction partners. After two successive reactions are carried out gradually. The position-specific ligat array that is fixed to the carrier material is incubated with a mixture of ligands. Ligands that are not bound to the ligat array are subsequently removed and the ligand/s that is/are bound to the ligat array are further characterised by means of mass spectrometry.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben ist ein Verfahren zur massenspektrometrischen Identifizierung von Bindungspartnern mit positionsspezifischen Arrays, wobei man auf einem Trägermaterial mittels positionsspezifisch aufgebracht kleiner Volumina von Reaktionspartnern ein positionsspezifisches Ligat-Array herstellt, wobei man schrittweise mindestens zwei aufeinander folgende Reaktionen ausführt, das auf dem Trägermaterial fixierte positionsspezifische Ligat-Array mit einem Gemisch von Liganden inkubiert, anschließend nicht an das Ligat-Array gebundene Liganden entfernt und die/die an das Ligat-Array gebundene/n Ligand/en weiter mittels Massenspektrometrie charakterisiert.

WO 01/18545 A3

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE 00/03071

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 G01N33/68 C12Q1/68 G01N33/543 H01J49/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 99 35502 A (THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL) 15 July 1999 (1999-07-15)	1
Y	the whole document	2-28
X	WO 97 43301 A (NOVARTIS AG.) 20 November 1997 (1997-11-20)	1
Y	the whole document	2-28
X	M. A. KELLY ET AL.: "Characterization of SH2-ligand interactions via library affinity selection with mass spectrometric detection." BIOCHEMISTRY., vol. 35, no. 36, 1996, pages 11747-11755, XP002062459	1
Y	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, PA., US ISSN: 0006-2960 the whole document	2-28
	--- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

Date of mailing of the international search report

8 March 2001

15/03/2001

Name and mailing address of the ISA

Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5618 Patentstra 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Griffith, G

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. lional Application No

PCT/DE 00/03071

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	P. L. COURCHESNE ET AL.: "Identification of proteins by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry using peptide and fragment ion masses (from "2D Proteome Analysis Protocols, Ed. A. J. Link)" METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY, vol. 112, 1999, pages 487-511, XP002103063 the whole document ----	1-28
A	WO 99 12040 A (SEQUENOM, INC.) 11 March 1999 (1999-03-11) the whole document ----	1-28
A	EP 0 742 438 A (BAYER CORPORATION) 13 November 1996 (1996-11-13) the whole document ----	1-28
A	S. R. PENNINGTON ET AL.: "Proteome analysis: from protein characterization to biological function." TRENDS IN CELL BIOLOGY., vol. 7, April 1997 (1997-04), pages 168-173, XP002103064 ELSEVIER SCIENCE LTD., XX ISSN: 0962-8924 the whole document -----	1-28

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. l. Application No

PCT/DE 00/03071

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9935502 A	15-07-1999	EP 1046038 A	25-10-2000
WO 9743301 A	20-11-1997	AU 2889097 A	05-12-1997
WO 9912040 A	11-03-1999	AU 9129898 A	22-03-1999
		DE 19882657 T	24-08-2000
		EP 1010008 A	21-06-2000
		NO 20001043 A	02-05-2000
EP 742438 A	13-11-1996	US 5834318 A	10-11-1998
		AU 716309 B	24-02-2000
		AU 5208796 A	21-11-1996
		CA 2175868 A	11-11-1996
		JP 9101306 A	15-04-1997

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03071

## A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGS/GEGENSTANDES

IPK 7 G01N33/68 C12Q1/68 G01N33/543 H01J49/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 99 35502 A (THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL) 15. Juli 1999 (1999-07-15)	1
Y	das ganze Dokument	2-28
	---	
X	WO 97 43301 A (NOVARTIS AG.)	1
Y	20. November 1997 (1997-11-20)	
	das ganze Dokument	2-28
	---	
X	M. A. KELLY ET AL.: "Characterization of SH2-ligand interactions via library affinity selection with mass spectrometric detection." BIOCHEMISTRY., Bd. 35, Nr. 36, 1996, Seiten 11747-11755, XP002062459 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, PA., US ISSN: 0006-2960	1
Y	das ganze Dokument	2-28
	---	
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*S\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. März 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

15/03/2001

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentaan 2  
NL - 2230 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2000, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Griffith, G

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. ionales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03071

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
A	P. L. COURCHESNE ET AL.: "Identification of proteins by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry using peptide and fragment ion masses (from "2D Proteome Analysis Protocols, Ed. A. J. Link)" METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY, Bd. 112, 1999, Seiten 487-511, XP002103063 das ganze Dokument ----	1-28
A	WO 99 12040 A (SEQUENOM, INC.) 11. März 1999 (1999-03-11) das ganze Dokument ----	1-28
A	EP 0 742 438 A (BAYER CORPORATION) 13. November 1996 (1996-11-13) das ganze Dokument ----	1-28
A	S. R. PENNINGTON ET AL.: "Proteome analysis: from protein characterization to biological function." TRENDS IN CELL BIOLOGY, Bd. 7, April 1997 (1997-04), Seiten 168-173, XP002103064 ELSEVIER SCIENCE LTD., XX ISSN: 0962-8924 das ganze Dokument -----	1-28



**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03071

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglieder der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9935502	A	15-07-1999	EP	1046038 A	25-10-2000
WO 9743301	A	20-11-1997	AU	2889097 A	05-12-1997
WO 9912040	A	11-03-1999	AU	9129898 A	22-03-1999
			DE	19882657 T	24-08-2000
			EP	1010008 A	21-06-2000
			NO	20001043 A	02-05-2000
EP 742438	A	13-11-1996	US	5834318 A	10-11-1998
			AU	716309 B	24-02-2000
			AU	5208796 A	21-11-1996
			CA	2175868 A	11-11-1996
			JP	9101306 A	15-04-1997